



คู่มือการให้บริการประชาชน

ชื่องาน : แนวทางการปฏิบัติผู้ป่วยห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง : พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน ๒๕๕๑

ระยะเวลา : ตลอด 24 ชั่วโมง

ขั้นตอน วิธีการ และ กระบวนการ :

1. เมื่อผู้ป่วยทุกรายมาถึงโรงพยาบาล หน้าห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉินจะได้รับการคัดกรอง ณ จุด คัดกรอง
2. ผู้ป่วยได้รับการคัดกรองจากพยาบาลวิชาชีพที่อยู่ ณ จุดคัดกรอง
3. ผู้ป่วยควรได้รับการประเมินจากพยาบาลคัดกรองทันที
4. พยาบาลใช้วิธีประเมิน โดยสังเกตลักษณะอาการที่ต้องการดูแลเร่งด่วน ดังนี้

- Look - ดูว่าผู้ป่วยมีอาการดังต่อไปนี้ กระจกกระส่าย สับสน, ปวด ชักเกร็งหรือไม่
- ลักษณะที่ผู้ป่วยมาโรงพยาบาลเช่น เดิน นอน หรือนั่งรถเข็นผู้ป่วยมา
 - ระดับความรู้สึกตัวของผู้ป่วย
 - ลักษณะการหายใจและจังหวะการหายใจ มีการตั้งรั้งของกล้ามเนื้อระหว่างกระดูกซี่โครง
 - มีอาการซีด เขียว เหงื่อออก ผิวหนังช้ำขึ้น

Listen

- ผู้ป่วยบอกว่าหายใจเหนื่อยและปวดระหว่างหายใจมีอาการไอหรือเสียง หายใจดัง
- ผู้ป่วยไม่พูด หรือพูดเป็นคำ ๆ หรือพูดไม่เป็นประโยค
- - ทรวงอกเคลื่อนไหวผิดปกติ

Feel

- ซีพจรเต้นผิดปกติ

5. วัดสัญญาณชีพเมื่อแรกรับ
6. ชักประวัติผู้ป่วยเกี่ยวกับอาการสำคัญที่มาโรงพยาบาล
7. ดูแลสภาพร่างกายทั่วไปขณะที่ได้รับการคัดกรองว่ามีร่างกายบริเวณใดที่ได้รับบาดเจ็บ



8. ประเมินระดับความรู้สึกตัวของผู้ป่วยที่เข้ามารับการรักษาที่ยังห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
9. พยาบาลแบ่งระดับการคัดกรองตามความเร่งด่วนของผู้ป่วยโดยใช้เครื่องมือ MOPH Triage
10. ทำเครื่องหมายลงบนแบบฟอร์ม MOPH Triage ว่าผู้ป่วยรายนี้จัดอยู่ในความรุนแรงระดับใด และเนื่องจากสาเหตุอะไร
11. แนบบแบบฟอร์ม MOPH Triage (Sate ER) ติดไปกับเวชระเบียนผู้ป่วย
12. ผู้ป่วยที่ผ่านระบบคัดกรองเข้ามารับการตรวจรักษาจากแพทย์ ณ บริเวณ Active area
13. แพทย์ห้องฉุกเฉินให้การดูแลรักษาผู้ป่วยตามความเร่งด่วนของผู้ป่วย
14. พยาบาลคัดกรองต้องมาประเมินผู้ป่วยอีกครั้งว่าได้รับการตรวจรักษาจากแพทย์ภายในระยะเวลาตามระดับที่ได้รับการคัดกรอง
15. ในระหว่างการรอตรวจหรือสังเกตอาการภายในห้องฉุกเฉิน ผู้ป่วยอาจมีอาการดีขึ้นหรือแย่ลง พยาบาลภายในห้องฉุกเฉินที่เป็นผู้ประเมินจะทำเครื่องหมายและลงเวลาที่ประเมินในแบบฟอร์ม MOPH Triage ว่าในขณะนั้นผู้ป่วยถูกเปลี่ยนไปอยู่ในระดับความรุนแรงมากขึ้นหรือน้อยลง เพียงใด เพราะเหตุอะไร

