

คีเลชันบำบัด Chelation therapy

คีเลชัน คือ การรักษาทางหลอดเลือดดำ โดยการ
ใช้กรดอะมิโน ชื่อ “EDTA” ผสมกับวิตามินแร่ธาตุและ
น้ำเกลือให้ทางเส้นเลือดเพื่อรักษาอาการอักเสบหรือ
การทำงานของผิดปกติของเซลล์ในผนังหลอดเลือด


คุณสมบัติ ของสาร “EDTA” จะไปจับกับสาร
จำพวก “โลหะหนักเป็นพิษ” ซึ่งสะสมอยู่ในเซลล์ผนัง
หลอดเลือด อาทิ ตะกั่ว แคดเมียม รวมถึงสารแร่ธาตุ
ที่ใช้ในร่างกาย ซึ่งมาจับผิดที่ในเซลล์หลอดเลือด เช่น
เหล็กและทองแดงการสะสมของโลหะหนักบนเซลล์
ภายในผนังหลอดเลือด เมื่อนานวันเข้าจะเหนียวนำ
ให้เกิด “อนุมูลอิสระ” บนผนังเซลล์ โคลเลสเตอรอล
จึงมาจับบนผนังหลอดเลือดทำให้หลอดเลือดแดงตีบตัว

เมื่อทำ “คีเลชัน” สาร “EDTA” จะไปจับตัวกับ
สารโลหะหนักและละลายออกมาพร้อมกันในเส้นเลือด
โดยถูกขับออกมาทางระบบไต นอกจากนั้น โคลเลสเตอรอล
ที่จับตัวอยู่จะค่อยๆ ถูกกำจัดให้ลดลง ส่งผลให้การ
ไหลเวียนของเลือดมีปริมาณมากขึ้นสารอนุมูลอิสระ
ทำให้เกิดผนังหลอดเลือดอักเสบ การเพิ่มแคลเซียม
ภายในเซลล์จะทำลายหน้าที่ของ Endothelial cells
เกิดการรวมตัวของเกร็ดเลือด กระตุ้น Macrophag
ทำให้ผนังหลอดเลือดแดงแข็ง สูญเสียการยืดขยายออก

PLAQUE

Plaque เกิดจากการสะสมของ fibrin แคลเซียม
และคอเลสเตอรอลซึ่งเกิดจากการขาด Protease และ
Lipase

การพบ Plaque แสดงถึงการไหลเวียนของโลหิต
ที่ไม่ดีความไม่สมดุลของแคลเซียมเกิดอาการอ่อนแรง
Plaque เกิดจากการสะสมของ fibrin แคลเซียมและ
คอเลสเตอรอลซึ่งเกิดจากการขาด Protease และ Lipase



คีเลชัน มีประโยชน์อย่างไร

- เพิ่มการไหลเวียนของเลือด
- ทำให้หลอดเลือดสะอาดและความยืดหยุ่นดีขึ้น
- ลดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด เช่น
ความดันโลหิตสูง
- ขจัดอนุมูลของสารโลหะหนักในเลือด
- ลดการก่อตัวของตะกรันและโคเลสเตอรอล
ในเส้นเลือด

กรทำ (Chelation therapy) เหมาะสมกับใครบ้าง.... ?

- ผู้ที่มีพฤติกรรมในการรับประทานอาหารที่ไม่เหมาะสม
เช่น ทานอาหารรสหวาน มัน เนื้อสัตว์ ของทอด
ปิ้งย่าง
- ผู้ที่สูบบุหรี่จัด - ดื่มแอลกอฮอล์มาก
- ผู้ที่มีภาวะเครียดอยู่เป็นเวลานาน
- สตรีที่วางแผนตั้งครรภ์
- ผู้ป่วยด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือด เช่น
ความดันโลหิตสูง
- ปวดเกร็งบ่อยขณะออกกำลังกาย
- ผู้ที่พบสารพิษและสารโลหะหนักในร่างกาย
จำนวนมาก



ข้อห้ามในการทำ คีเลชัน

- ไตวาย
- ตั้งครรภ์
- แพ้สาร EDTA
- มีไข้
- สมองผิดปกติจากตะกั่วเฉียบพลัน
(Acute lead encephalopathy)

ข้อควรระวัง

- ผู้รับประทานยาต้านการแข็งตัวของเลือด
(Anticoagulation)
- ผู้ที่ภาวะหัวใจล้มเหลว
- ไตบกพร่อง
- โรคตับ

อาการข้างเคียง

- บางท่านอาจมีอาการใช้ต่างๆ ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตามต่างกาย



ได้รับการสนับสนุนข้อมูลเผยแพร่จากงานแพทย์ทางเลือก

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า : โดยงานแพทย์ทางเลือก
ให้บริการทำ คีเลชัน ทุกวันอังคาร และวันพฤหัสบดี
ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 16.00 น.
ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
02-5284567 ต่อ 5601, 5603

พิมพ์ครั้งที่ 1 จำนวน 5,000 ฉบับ
วัน/เดือน/ปี ที่พิมพ์ ธันวาคม 2555



คีเลชันบำบัด Chelation Therapy



แพทย์ทางเลือก / ผังเข็ม

โฮมีโอพาธีคลินิก

HOMOEOPATHY CLINIC

คีเลชันคลินิก

CHELATION CLINIC

ผลิตและเผยแพร่โดย

กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จังหวัดนนทบุรี
โทรศัพท์ 02-528-4567 ต่อ 1652-3

PNK 120