

# Warning Signs Of Sepsis

สัญญาณอันตรายของผู้ป่วยที่มีภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด

ไข้สูงหรือ  
มีอาการ  
กระสับกระส่าย



ไข้อ่อนเพลีย  
ปัสสาวะ  
ออกน้อย



ไข้ขอบเหนียว  
หรือ  
หายใจลำบาก



แนวปฏิบัติการประเมินสภาพผู้ป่วยโดยใช้ SOS score (search out severity score)

สำหรับเจ้าหน้าที่  
ถ้าประเมินผู้ป่วย  
แล้วพบว่า  
**SOS Score ≥ 3**  
ควรรีบส่ง  
โรงพยาบาล  
ทันที!

score	3	2	1	0	1	2	3
อุณหภูมิ (ไข้)		≤ 35	35.1-36	36.1-38	38.1-38.4	≥ 38.5	
ความดันโลหิต (ค่าบน)	≤ 80	81-90	91-100	101-180	181-199	≥ 200	ให้ยากกระตุ้นความดันโลหิต
ชีพจร	≤ 40		41-50	51-100	101-120	121-139	≥ 140
หายใจ	≤ 8	ใส่เครื่องช่วยหายใจ		9-20	21-25	26-35	≥ 35
ความรู้สึกตัว			สับสน กระสับกระส่าย ที่เพิ่งเกิดขึ้น	ตื่นดี พูดคุยรู้เรื่อง	ซึม แต่เรียกแล้วลืม ตาสะลึม สะลือ	ซึมมาก ต้องกระตุ้น จึงจะลืมตา	ไม่รู้สึกตัว แม้จะกระตุ้นแล้วก็ตาม
ปัสสาวะ/วัน		≤ 500	501-999	≥ 1,000			
ปัสสาวะ/8 ชม.		≤ 160	161-319	≥ 320			
ปัสสาวะ/4 ชม.		≤ 80	81-159	≥ 160			
ปัสสาวะ/1 ชม.		≤ 20	21-39	≥ 40			

