

การฉีดยา เข้าวุ้นตา



Post-injection

หลังจากห่านได้รับการฉีดยาแล้ว
ควรปฏิบัติตัวดังต่อไปนี้

1

หลีกเลี่ยงการขี้ตา

ป้องกันไม่ให้น้ำหรือสิ่งแผลกปลอมเข้าตาข้างที่ฉีดยา ทำความสะอาดในหน้าโดยใช้ผ้าชุบน้ำสะอาดเช็ดหน้า แทนการล้างหน้าสามารถอาบน้ำและแปรปักษ์ได้ตามปกติ แต่ต้องระวังไม่ให้น้ำกระเด็นเข้าตาเป็นเวลา 3-5 วัน ตามที่แพทย์แนะนำ



2

หากมีอาการปวดตา

ให้รับประทานยาพาราเซตามอล ขนาด 500 มก. ครั้งละ 1 เม็ด โดยควรรับประทานห่างกันประมาณ 4-6 ชั่วโมง หากห่านรับประทานยาพาราเซตามอลไปแล้วประมาณ 2 ครั้ง และอาการปวดไม่ทุเลาและมีอาการปวดร้าวมากที่ท้ายทอย คลื่นไส้ หรืออาเจียน ให้รับมาพบท้ายทันที



3

หลังฉีดยาเข้าวุ้นตาอาจเกิดอาการแทรกซ้อน
เหล่านี้ได้ คือ

- มองเห็นจุดสีดำหรือฟองอากาศลักษณะกลมลอดไปมา ในลานสายตาข้างที่ฉีดยา ซึ่งสามารถหายเองได้ภายใน 2-3 วัน
- เลือดออกที่เยื่อบุตาขาว ซึ่งสามารถหายเองได้ภายใน 7-10 วัน



4

ให้รับมาพบท้ายทันที

หากห่านสังเกตเห็นว่าตาข้างที่ได้รับการฉีดยาขี้ตา สีเขียว บวมแดง ปวดตามาก การมองเห็นแย่ลงกว่า ก่อนฉีดยา หรือมีอาการแพ้แสง



5

ควรมาตรวจตามแพทย์ทันทุกครั้ง เพื่อติดตามผลการรักษา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมทุกวันในเวลาราชการ
ที่ห้องตรวจผู้ป่วยนอกแผนกจักษุ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
โทรศัพท์ 02-5284567 ต่อ 10410



พิมพ์ครั้งที่ 1 จำนวน 5,000 ฉบับ
มกราคม 2566

คืออะไร ?

การฉีดยาในกลุ่มที่มีชื่อว่า Anti-VEGF เช้าไปภายในวุ้นตา ซึ่งเป็นวิธีที่ได้รับการยอมรับและใช้กันอย่างแพร่หลายในการรักษาโรคทางจอตาหลายโรค ได้แก่ โรคจอตาเสื่อม ชนิดเปยก จุดภาพชัดบวมจากเบาหวาน จุดภาพชัดบวมจากหลอดเลือดดำที่จอตาอุดตันและภาวะเสื่นเลือดตา อกใหม่ที่ผิดปกติ



โรคเหล่านี้
ส่งผลให้การมองเห็นผิดปกติ
 เช่น ตามัว เห็นภาพเบี้ยว
 เห็นสีผิดไปมีจุดเม็ดใน
 บางบริเวณของภาพ
 ซึ่งหากไม่ได้รับการรักษาอาจ
 ทำให้ตาบอดได้

Pre-injection preparation

การเตรียมตัว
ก่อนได้รับการฉีดยา มีอะไรบ้าง?

ทำน้ำลายสามารถปฏิบัติตัวได้ตามปกติ
โดยเฉพาะการรับประทานยาที่ทานอยู่ประจำ
 เช่น ยาลดความดัน ยาละลายลิ่มเลือด
(ไม่ควรหยุดยา)

ควรแจ้งแพทย์และเจ้าหน้าที่พยาบาล
ให้ทราบก่อนหากทำน้ำลายมีอาการต่อไปนี้
 มีไข้ ไอ เนื้องจากมีโอกาสในการติดเชื้อได้ง่าย
 มีขี้ตา หรือตาแดง



Injection process

หลังจากหาน้ำได้รับการยืนยัน
ว่าสามารถได้รับการฉีดยา
เข้าวุ้นตาแล้ว
แพทย์จะเป็นคนทำการฉีดยา
โดยวิธีปราศจากเข็มให้ห่าน

โดยเริ่มจาก

1




หยดยาชาให้ผู้ป่วย
รวมถึงยาฆ่าเชื้อ Povidone iodine

2




ทำความสะอาดบริเวณรอบดวงตา
ด้วย Povidone iodine




คลุมหน้าด้วยผ้าพิเศษและใช้เครื่องมือ^{ช่วย}ยึดเปลือกตาไว้เพื่อเปิดเปลือกตา

3



ฉีดยาเข้าวุ้นตา
โดยฉีดผ่านบริเวณตาขาว

4



หลังจากการฉีดยาอาจมีการประเมิน
การมองเห็นและภาวะแทรกซ้อน
ของทำนอักษรรัง